

<b>SWESEMs utbildningsutskott</b>
<small>Rubrik</small> <b>Främmande kropp luftväg – medsittning</b>
<small>2012-09-17</small>

**1. Förberedelser**

- Förbereder utrustning som kan behövas
- Kontaktar ÖNH och/eller narkos
- Läkaren gör en korrekt bedömning om patienten är:
  - Vid medvetande, pratar, hostar effektivt
  - Medvetandesänkt, oförmögen att prata, tilltagande cyanos, hostar ineffektivt
  - Medvetslös

**2. Åtgärder***Vid medvetande, pratar, effektiv hosta*

- Observerar, re-evaluerar tills främmande kropp är avlägsnad

*Medvetandesänkt, oförmögen att prata, tilltagande cyanos, ineffektiv hosta*

- Ryggdunkningar mellan skulderblad x 5. Barn hålls med huvudet lägre.
- Buk- eller brösttryck x 5. Buktryck för alla utom barn < 1 år och uppenbart gravida. Barn hålls med huvudet lägre.
  - Buktryck: Heimlich manöver eller motsvarande
  - Brösttryck: sternalt som vid HLR men med snabbare intryckning och lägre frekvens.
- Re-evaluerar och upprepar tills patientens tillstånd förändras

*Medvetslös*

- Inspekterar munhålan; utför ”finger sweep” x 1 enbart om den främmande kroppen är synlig
- Öppnar luftvägen (t ex head-tilt / chin-lift) och gör 5 försök till inblåsning om patienten är ett barn
- Påbörjar HLR
- Utför laryngoskopi och bedömer främmande kroppens lokalisation

*Synlig och ovanför stämbanden*

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Försöker ta bort kroppen med hjälp av Magills tång</li> <li><input type="checkbox"/> Koniotomi alt nål cricotyroidotomi om det inte går att ta bort kroppen</li> </ul> |
|--|

*Osynlig eller distalt om stämbanden*

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Endotrakeal intubation; puttar den främmande kroppen ner i en bronk</li> <li><input type="checkbox"/> Backar tuben till normalläge och ventilerar den andra lungan</li> </ul> |
|---|

- Re-evaluerar effekt av gjorda åtgärder

**3. Kontroller/planering efter att det akuta luftvägshotet är handlagt**

- Utesluter blödning av främmande kropp
- Tar beslut om bronkoskopi krävs för att utesluta/handlägga kvarvarande främmande kropp
- Utesluter att skador av buk-/bröstkompressioner uppstått
- Tar beslut om infektionsrisk föranleder uppföljning

**Återkoppling till Läkaren:**