

SWESEM's utbildningsutskott
<small>Rubrik</small>
Initialt omhändertagande av det nyfödda barnet - medsittning
<small>2010-09-14</small>

BedömningarÅtgärder**Överblick****Överblick**

- Säkerhet?
- Livlös (andning, tonus, färg)?

- Handskar
- Torka/stimulera & motverka hypotermi

Airway & C-spine**Airway & C-spine**

- Skriker barnet? Om inte:

- Lägg på rygg med huvudet i neutralt läge
- Inspektera munhålan. Sug om mekonium OCH livlöst

Breathing**Breathing**

- Tillräcklig egenandning efter 30 sekunder? Om inte:
- Fungerande maskventilation? Om inte:

- Ventilera 60/min med mask
- Justera grepp, överväg intubation.
- Säkerställ adekvat ventilation innan du fortsätter till Circulation**

Circulation**Circulation**

- Hjärtfrekvens < 60/min efter 30 sekunder med adekvat ventilation?
- Misstanke om blödning/sepsis hos barnet

- Bröstkompressioner
- 3:1 kompressioner:ventilationer, 90:30/min
- Etablera infart via navelven, pvc eller IO nål och ge bolus 10 ml/kg NaCl 0,9%

Reevaluering**Reevaluering**

- Hjärtfrekvens
- Effektiv egenandning? Om ja:
- Central cyanos? Om ja:

- Om HF > 60/min avbryt kompressioner Om HF < 60/min Adrenalin 10 ug/kg via navelven / IO nål
- Uppehåll i manuell ventilation, monitorera
- Överväg extra syrgas, ytterligare vätskebolus

Återkoppling till läkaren: